

樂生婦幼醫院用藥

110.05.25 修訂

藥品名(英文)：**Transamin (Transamin[®]) 250mg/Cap**

藥品名(中文)：斷血炎膠囊

藥廠名稱：台灣第一三共股份有限公司

主成分及含量：Tranexamic acid 250mg



外觀描述：明紅橙/淡黃色膠囊 無刻字

藥品許可證字號：內衛藥製字第 15392 號

適應症：全身及局部出血或出血性疾病。

用法用量：成人一天 750~2000 mg，分 3~4 次服用。

孩童一日量一歲以下 75~200 mg，2~3 歲 150~350 mg，4~6 歲 250~650 mg，7~14 歲 400~1000mg，14 歲 750~2000 mg，分 3~4 次服用。

禁忌：已得血栓之病患(腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎等)或者可能引起血栓之病患；消費性凝固障害的病患(要與 Heparin 併用方可)；對本劑已具過敏症的病患。

副作用：腹瀉，性功能障礙，噁心、嘔吐，月經不順，淚液分泌增加，皮膚紅疹或癢。有過敏現象時即應中止服用。

其他注意事項：

1. 慎重投與：腦血栓、心肌梗塞、血栓靜脈炎等之患者。
2. 腎機能不全之患者。

孕婦用藥等級：**B**