

樂生婦幼醫院用藥

藥品名 (英文): **Voren-K 50mg/ S.C. Tab.**

藥品名 (中文名): 非炎鉀 糖衣錠 50 毫克

藥廠名稱: 永信藥品工業股份有限公司

主成份及含量: Diclofenac Potassium 50mg



外觀描述:

橘色圓形糖衣錠 上刻 YSP 59

藥品許可證字號: 衛署藥製字第 044403 號

適應症: 緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛

用法用量: 建議起始劑量為每日 100-150mg，症狀較輕及 14 歲以上青少年每日劑量為: 75-100mg；前述用量須分 2-3 次投予。

禁忌: 消化性潰瘍患者。重症之血液異常患者。重症之肝障害患者。重症之腎障害患者。對本藥過敏之患者。患有 Aspirin 氣喘或曾有該病歷之患者。

副作用:

1. 可能出現消化性潰瘍、胃腸出血等症狀。有時亦可能出現有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛及下痢等症狀。
2. 有時會出現頭痛、暈眩、嗜睡等。

其他注意事項: 儘量避免與其他消炎、鎮痛劑合併使用。本藥服用後，若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等)，請立即停藥並請教醫師或藥師。

孕婦用藥等級: **C 級**。懷孕最後 3 個月的婦女使用本藥須特別注意(因可能造成子宮收縮無力及/或胎兒動脈閉鎖過早)。

仿單: <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01044403&Seq=009&Type=9>