

樂生婦幼醫院用藥


109.05.28 修訂

藥品名 (英文): **Bricanyl (Brandyl®) 2.5mg/Tab**

藥品名 (中文): 鎮喘錠

藥廠名稱: 中國化學製藥股份有限公司

主成分及含量: Terbutaline 2.5mg



外觀描述:

藥品許可證字號: 衛署藥製字第 037396 號

適應症: 支氣管氣喘、慢性支氣管炎、氣喘性支氣管炎、支氣管擴張症、肺氣腫。

用法用量:

1. 成人: 通常劑量每次 5mg, 每天 3 次, 起始劑量也可以用 2.5mg, 每天 3~4 次。依治療效果來調整劑量, 但每天以不超過 15mg 為原則。
2. 小孩(12~15 歲): 每次 2.5mg, 每天 3 次。

禁忌: 對擬交感神經胺藥物嚴重過敏或有甲狀腺中毒症者。

副作用: 心跳不規則, 嗜睡, 咳嗽, 頭痛, 神經質, 顫抖。

其他注意事項:

1. 禁止與 epinephrine 及 isoproterenol 等 catecholamine 類的藥物併用, 因可能引起心律不整或心跳停止現象。
2. 有甲狀腺機能亢進、高血壓、心臟病、糖尿病的病患應慎重投與。

孕婦用藥等級: **B**

仿單: <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01037396&Seq=007&Type=9>