樂生婦幼醫院用藥

藥品名（英文）：**Doxycycline（Doxymycin®）100mg/Cap**
藥品名（中文）：多喜黴素
藥廠名稱：永信藥品工業股份有限公司
主成分及含量：Doxycycline 100mg

外觀描述：　　藍色與黃色膠囊
藥品許可證字號：衛署藥製 035692 號
適應症：用於治療對本藥具感受性的葛蘭氏陽性菌及葛蘭氏陰性菌、立克次體、巨型濾過性病毒所引起之感染，其他用途如預防旅行者腹瀉、青春痘
用法用量：
成人：每次使用劑量 100mg，一天 2 次。
兒童：每天每公斤體重 2.2mg 分成 1~2 次給藥，8 歲以下不建議使用
禁忌：對此藥任何成份或其他四環素類過敏者；懷孕期或哺乳者；少於 8 歲的兒童。
副作用：對光敏感、噁心、嘔吐、腹瀉等.。
其他注意事項：
勿自行停藥。 口服避孕藥效果受影響。為腸溶錠應整粒吞服不可研磨或咬碎，以免藥物提前於胃中崩解，應以充足清水服用此藥以減低此藥對食道的刺激，四環素在空腹時服用吸收最好，但若發生噁心及腸胃不適，則可與食物併服（進食後立即服藥），以減少副作用；服用四環素前後兩小時內，勿服用含二價或三價陽離子藥物或食物(如：胃藥、鈣片、鐵劑、牛奶等)；使用四環素可能會對陽光產生過敏，因此服藥後應避免直接日曬，外出時應做好防曬措施。
孕婦用藥等級:**X**

仿單：https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01009654&Seq=006&Type=9