

樂生婦幼醫院用藥

109.02.25 制訂

藥品名 (英文)：Labetalol(Labtal®) Tablet 200mg

藥品名 (中文名)：壓血泰膜衣錠 200mg

藥廠名稱：杏輝藥品工業藥股份有限公司

主成份及含量：Labetalol 200mg



外觀描述：橘色/圓微形/印有(SINPHAR)字樣/膜衣錠

藥品許可證字號：衛署藥製字第 039703 號

適應症：高血壓

用法用量：本藥須由醫師處方使用。視高血壓之嚴重強度調整病患之個別劑量本劑成人應隨著食物一起吞服。

高血壓-初劑量以每日兩次，每次 100mg 開始治療，必要時得以一日兩次每次 100mg 之方式間歇性地(2-14 天的間隔)增加其劑量。大多數患者在服用一日兩次每次 200mg 的劑量時即可控制住血壓。一日最大劑量可增至 800mg，惟須以日服兩次的方式給藥。對於嚴重、頑固的高血壓亦曾給予一日 2400mg(分三次或四次投藥)的最大劑量。

妊娠高血壓-初劑量為一日兩次每次 100mg，必要時得以一週為一個間隔，間歇性地以一日兩次每次 100mg 之方式增加服用劑量。對於嚴重高血壓則可給予一日三次之投藥方式，但其一日最大劑量不得超過 2400mg。住院之嚴重高血壓患者可逐日增加劑量。

禁忌：禁用於支氣管氣喘、明顯心臟衰竭，二級或三級心傳導阻斷、心臟性休克，以及其他伴有嚴重性及持續性低血壓之患者，或是嚴重心動徐緩者。對 labetalol 有過敏性之患者禁用本劑。

副作用：頭痛、疲倦、眩暈、抑鬱及昏睡、鼻充血、發汗及少數的腳踝水腫。

孕婦用藥等級：C

仿單：<https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01039703&Seq=005&Type=9>