

樂生婦幼醫院用藥

藥品名 (英文): (管)*Stilnox(Zodenox®) 10mg

藥品名 (中文名): 悠眠膜衣錠

藥廠名稱: 永信藥品工業股份有限公司

主成份及含量: Zolpidem Hemeitartrate 10mg



外觀描述: 白色長橢圓形扁錠，一面有一刻痕，另一面有 YSP29 字樣

藥品許可證字號: 衛署藥製字第 049217 號

適應症: 鎮靜安眠劑

用法用量:

一般劑量: (1)65 歲以下成人: 睡前 1 錠。(2)65 歲以上成人: 初劑量以 1/2 錠睡前給藥。每日請勿超過 1 錠。(3)通常短期間給藥治療。

禁忌: 本品不可用於下列病例: (1)15 歲以下的小兒、(2)孕婦、(3)哺乳婦。

副作用: 本品會引起或多或少的不適感，如暈眩、嗜眠、噁心、頭痛、記憶障礙、夜間不安、腹瀉、跌倒。

其他注意事項:

1. 失眠可能會由各種原因所造成，不一定需要藥物治療。
2. 如同其它的安眠藥，長期服用 Stilnox10 公絲膜衣錠通常是無益且不被推薦的
3. 在服用睡眠導入劑後，若於夜間起床，其危險性有：a. 若於可能性的跌倒時，反應時間減慢。b. 暈眩 的感覺。
4. 假若您有下列任何情況時，請通知您的醫師：腎臟或肝臟疾病、呼吸困難、肌肉疾病(重症肌無力症：醫師必須更加注意此病例)。
5. 於老年病患須小心使用。
6. 在整個療程中禁止飲用含酒精的飲料。
7. 注意本品對於駕駛人及機器操作者可能會導至嗜眠的危險性。
8. 若長期使用本品治療，避免突然停藥或急速減量。
9. 失眠症的治療超過 2~3 週時，需經專科醫師再評估。
10. 具中樞神經系統抑制作用，從事需精神專注或操作危險器械者，應特別注意。併用其他中樞神經系統抑制劑時，可能需要調整劑量。

孕婦用藥等級:C