

# 樂生婦幼醫院用藥

109.03.19 修訂

**藥品名(英文)：**Tapal (Ascotyl®) 100mg/Cap

**藥品名(中文)：**暢血脈腸溶微粒膠囊

**藥廠名稱：**生達化學製藥股份有限公司

**主成分及含量：**Aspirin 100mg



**外觀描述：**

深紅紫/透明膠囊 STD. CA-04

**藥品許可證字號：**衛署藥製字第 043664 號

**適應症：**退燒、止痛、促進血液循環。

**用法用量：**一天一粒，與水服用。本藥須由醫師處方使用。

**禁忌：**嚴重肝、腎疾病、血友病或其他出血性疾患、糜爛性胃炎或消化性潰瘍患者禁用

**副作用：**偶有胃腸不適、噁心、嘔吐、胃黏膜受損、潰瘍…等。如出現嚴重腹痛、胃痛、黑便、血尿、耳鳴、蕁麻疹、呼吸困難等症狀請停藥並立即就醫。

**授乳婦：**本藥使用於授乳婦之安全性尚未確立。

**其他注意事項：**

1. 服用後，若有發疹、發紅、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛..等症狀時，應停藥並就醫。
2. 若你每天喝三杯或更多之酒精性飲料，請詢問你的醫師，你是否能服用阿斯匹靈或其他鎮痛解熱劑，因阿斯匹靈可能造成胃出血。
3. 蠶豆症（6-磷酸葡萄糖脫氫酶缺乏，Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficiency）患者不得服用本類藥品。
4. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，曾有消化性潰瘍或使用抗凝血劑之病患，不得服用本藥。
5. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本藥不得使用於兒童或20歲以下青少年之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能與一種罕見而嚴重之疾病雷氏症候群（Reye's Syndrome）有相關性。

**孕婦用藥等級：**C

仿單: <https://info.fda.gov.tw/MLMS/ShowFile.aspx?LicId=01043663&Seq=009&Type=9>