

樂生婦幼醫院用藥

109.03.19 修訂

藥品名(英文)：**Aminophylline**

藥品名(中文)：氨基非林注射液

藥廠名稱：安星製藥股份有限公司

主成份及含量：每 10ml 含 Aminophylline 250mg



外觀描述：

藥品許可証字號：衛署藥製字第 004776 號

適應症：支氣管擴張，慢性肺栓塞症，利尿劑，心衰竭

用法用量：一日 1~2 次，一次 250mg，以生理食鹽液或葡萄糖液稀釋，
於 5~10 分鐘徐徐靜注，小兒一次 3~4mg/kg，靜注投與，
間隔 8 小時以上，最高用量一日不得超過 12mg/kg
常用量：一次 250mg
極量：一次 500mg，一日 1.5g

禁忌：(1)曾對 Xanthine 類藥物過敏反應。(2)消化性潰瘍與進行性
胃炎者可能不宜使用。(3)對 ethylenediamine 過敏。

副作用：可能會引起心悸，心律異常、極度口渴、耳鳴、肌肉抽筋、
噁心，嘔吐，胃痛，或食慾差…等

其他注意事項：

1. 老年人的使用劑量應降低。
2. 有癲癇病史患者建議改用其他藥物治療。
3. 心臟疾病患者用藥應特別小心。
4. 當藥物濃度很高時、可能或出現嚴重副作用，如：痙攣、上心室心搏過速.. 等。
5. 氣喘危象(status asthmaticus)、肝功能不全、慢性阻塞性肺疾病、心律不整病患。

孕婦用藥分級：**C**